



Aménager ses parcelles pour la tourterelle des bois

Pourquoi aménager des parcelles pour la tourterelle des bois?

La tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) est une espèce en déclin sévère, qui a perdu plus de 95% de ses effectifs depuis 1990, notamment à cause de l'intensification de l'agriculture. Elle niche en forêt ou dans des bosquets et des haies vives, mais trouve sa nourriture en zone agricole. En effet, la tourterelle des bois se nourrit de graines de plantes sauvages, qu'elle trouve au sol dans des zones où la végétation est basse et éparse.

Tourterelle des bois ou tourterelle turque?

La tourterelle des bois est un peu plus petite que la tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*). Le plumage de son ventre est gris rosé, avec sur les ailes et le dos des motifs écailleux noirs et roux. Elle porte sur les côtés du cou une tache formée de lignes noires et blanches. On la repère le plus souvent à son chant, un roucoulement doux et étouffé, venant d'une haie ou d'une lisière, où elle reste à l'abri des regards.

La tourterelle turque est quant à elle entièrement beige clair, avec un demi collier noir à l'arrière du cou. Cet oiseau est arrivé naturellement du sud-est de l'Europe dans les années 1960 et est maintenant très commun. Elle est très liée à l'homme et s'observe souvent dans les villages ou aux abords des fermes.

Tourterelle des bois



Tourterelle turque





En pratique

La tourterelle des bois niche dans les broussailles, se nourrit au sol et consomme une grande diversité de graines de plantes sauvages. L'objectif est donc de développer des parcelles présentant des plages de sol nu où des plantes sauvages ont l'occasion de monter en graines de fin avril à juillet, pour couvrir la période de nidification de l'espèce, à l'interface entre des zones cultivées et des zones de haies ou de buissons.

Pour obtenir des parcelles semi-ouvertes favorables à la tourterelle des bois, deux possibilités existent :

Un mélange de légumineuses peu couvrant

- Bande de hautes herbes en bordure de culture, qui jouera un rôle de tampon (facultatif)
- Semis léger (10 kg/ha) d'agrostis, de pâturin des prés et de lotier, à réaliser en fin d'été (du 15/08 au 30/09), ou à défaut au printemps sur sol réchauffé
- Déprimer annuellement le couvert à l'automne (du 01/10 au 15/03) (rotative ou vibroculteur), afin qu'il ne se redéveloppe pas avant l'été suivant. Si le couvert se développe trop au cours de la saison, une intervention est à discuter avec le conseiller

Une jachère noire

- Bande de hautes herbes en bordure de culture, qui jouera un rôle de tampon
- Bande de ressui à travailler annuellement soit entre le 1^{er} août et le 1^{er} novembre, soit entre le 1^{er} février et le 15 mars, soit les deux. Selon l'évolution de la parcelle et le type de végétation qui se développe, le conseiller pourra modifier les périodes de gestion
- Broyage obligatoire des chardons et des rumex en juillet

Pour en savoir plus

Loïc Huaux · 0499 16 40 76
lhuaux@natagriwal.be

Crédits photos: A. Laudelout, Imran Shah, Pixabay
Version 05/2024 · E.R.: H. Bedoret - Natagriwal asbl
Chemin du Cyclotron, 2 - Boîte L07.01.14 - 1348 Louvain-la-Neuve

